



Disminuye distribución de anticonceptivos en 2020



Fuente: <https://static.enfermeria21.com/wp-content/uploads/ddimport/2015/05/M%C3%A9todos-anticonceptivos.jpg>

Estadísticas del Ministerio de Salud, indican un descenso en la cobertura de distribución de métodos anticonceptivos en el país durante el periodo enero-diciembre de 2020.

La baja representa el 22.40% con relación a 2019 y el 28.33 en comparación con 2018, en todos los grupos de edad de población usuaria conformada especialmente por mujeres, quienes usualmente asumen de forma exclusiva la prevención reproductiva debido a sesgos de género, no obstante, que esta debería ser responsabilidad compartida entre mujeres y hombres.



ORMUSA



Alianza para la SSSR
en El Salvador

Con el apoyo de:



Asamblea de
Cooperación
por la Paz

Nafarroako
Gobernua



Gobierno
de Navarra



FOUNDATION
FOR A
JUST
SOCIETY

Cantidad variable de suministro de métodos anticonceptivos entre hombres y mujeres, desde 2018 hasta 2020 en El Salvador

	Hombres	Mujeres
2018	85	150 413
↓		
2019	84	138 928
↓		
2020	49	107 806

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA con datos entregados por OIR MINSAL.



Datos del Ministerio de Salud de El Salvador, recopilados por el Observatorio de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, registran en 2020, 107,806 mujeres usuarias de métodos anticonceptivos y 49 hombres.

Los métodos más utilizados fueron inyectables, seguidos de los intradérmicos.

Los servicios básicos de salud sexual y reproductiva se vieron afectados por la reducción de atenciones de salud y la cuarentena domiciliar obligatoria a causa de la pandemia por el COVID-19. La disminución se refleja en las cifras de mujeres, de todos los rangos de edad, que han sido afectadas en el suministro de métodos anticonceptivos.

De estos datos, existen 1,333 casos en los que estos fueron administrados a niñas entre 10 a 15 años, es necesario establecer la situación familiar de estas

niñas para descartar abuso sexual o si corresponde a las acciones del Minsal para prevenir un segundo embarazo; en el grupo de 16 a 18 años, el Ministerio de Salud reporta que brindó 9,746 atenciones.

Estas cifras indican una disminución al comparar los números correspondientes de enero a diciembre 2019, año en el que 2, 426 niñas de 10 a 15 años recibieron métodos anticonceptivos, así como a 13 742 adolescentes de 16 a 18 años.¹

Al cierre de 2020, hay una reducción del 45.05% en la entrega de métodos anticonceptivos a niñas entre 10 a 15 años en comparación a 2019; y una reducción del 29.1% en la entrega al grupo de 16 a 18 años en el mismo periodo.

Mujeres continúan siendo las mayores usuarias de métodos de planificación familiar

Las cifras confirman al hecho que sigue recayendo en las mujeres la responsabilidad de los cuidados y

¹Información proporcionada por OIR MINSAL.

Tipos de métodos anticonceptivos mayormente utilizados por niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, 2020



Edad	Inyectable	Oral	Barrera	DIU	Natural	Intradérmico	Otro
10-15	1319	98	23	68	1	301	3
16-18	7350	598	124	433	16	1215	10
19-30	48832	5554	976	4052	155	6538	316
31-40	16409	2479	438	1406	77	1173	369
41-50	5180	1044	177	509	15	156	456
51-55	139	47	7	21	1	6	14

Fuente: Elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por OIR MINSAL.

sobre todo, la prevención de la reproducción, siendo este un escenario propicio para continuar visualizando las inequidades que viven las mujeres a diario en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva.

Documentos publicados por el Ministerio de Salud, reportan 9873 inscripciones de métodos anticonceptivos permanentes de enero a diciembre de 2020. De las cuales, 1 fue realizada a una niña de 12 a 14 años en la fase de post-parto.²

Los números indican que los hombres no optan por métodos seguros como la vasectomía, ya que solo 15 se sometieron a este procedimiento de esterilización masculina.³

De acuerdo a información del ISSS⁴, la vasectomía es un procedimiento permanente que impide que el espermatozoide salga a través del semen y entre a la vagina durante la relación sexual e imposibilita al hombre de embarazar a una mujer.

Este es un método anticonceptivo seguro que no afecta su desempeño sexual y que tiene muchas ven-

tajas. La cirugía no toma más de 30 minutos y la recuperación lleva menos de una semana. La punción es tan pequeña que se cura sin necesidad de suturas, ya que es un procedimiento quirúrgico seguro y sencillo; demora 3 meses en actuar o hacer efecto. El hombre o la pareja deben usar condones u otro método anticonceptivo durante los 3 meses siguientes a la vasectomía⁵.

Este método no provoca ningún efecto secundario en la salud de los hombres, como si sucede con las mujeres, quienes generalmente enfrentan consecuencias por el uso de algunos anticonceptivos. Sin embargo, hay poca difusión de la vasectomía, sumado al machismo y prejuicios que persisten en torno a la esterilización masculina, por lo cual es importante que las autoridades de salud impulsen campañas informativas que incentiven este método entre la población masculina.


² Atenciones preventivas dadas en los establecimientos de salud del MINSAL, en el periodo de enero a diciembre de 2020

³Idem.

4. <http://aps.iss.gov.sv/familia/hombre/Todo%20lo%20que%20debes%20saber%20sobre%20la%20vasectom%C3%Ada>

5. Idem


Métodos anticonceptivos permanentes en El Salvador, enero– diciembre 2020



Fuente: Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos de la OIR/ MINSAL.

En cuanto a las atenciones preventivas de preconcepción brindadas por el Ministerio de Salud, en 2020, se registran 4573 inscripciones. El departamento de La Libertad fue donde se brindó el mayor número de atenciones con 557 y, Cabañas, registra la cifra menor sumando 155.

Los datos evidencian que los departamentos al interior del país, son lugares donde el acceso a la salud sexual y reproductiva es un derecho más limitado para la población.



Fuente: gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos del MINSAL.