


Infecciones de transmisión sexual en 2021

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes que se transmiten por contacto sexual. Según las últimas estimaciones de la OMS, aproximadamente 38 millones de personas sexualmente activas de 15 a 49 años de edad en las Américas tienen una Infección de Transmisión Sexual (ITS) fácilmente curable (Clamidia, gonorrea, sífilis y/o tricomoniasis).¹

En El Salvador, de enero a diciembre de 2021 se registraron 8225 casos de este tipo de infecciones; de los cuales, 5526 corresponden a mujeres. Los casos registrados el último año representan una disminución en comparación con los años anteriores.



Fuente: Gráfico elaboración propia con datos proporcionados por OIR MINSAL.


En las mujeres, las infecciones de transmisión sexual suelen ser asintomáticas o no representan síntomas evidentes (en ocasiones no se notan porque son internas). A diferencia de los hombres, las mujeres pueden no experimentar inicialmente ningún dolor, y por tanto es menos probable que busquen rápidamente un tratamiento médico.

La situación, a menudo, se complica por el estigma que pesa sobre las infecciones de transmisión sexual, debido a la inaccesibilidad de las clínicas, la falta de dinero, las actitudes negativas del personal trabajador en salud respecto de las mujeres infectadas, y la propia preocupación de las mujeres con demasiadas responsabilidades domésticas o tareas del hogar y de cuidado.²

¹ [https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-sexual#:~:text=Las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual%20\(ITS\)%20se%20propagan%20predominantemente%20por,la%20sangre%20o%20productos%20sangu%C3%ADneos](https://www.paho.org/es/temas/infecciones-transmision-sexual#:~:text=Las%20infecciones%20de%20transmisi%C3%B3n%20sexual%20(ITS)%20se%20propagan%20predominantemente%20por,la%20sangre%20o%20productos%20sangu%C3%ADneos).

² <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-592002/el-genero-y-la-sociedad-civil/impacto-de-genero-del-vih-sida-y-las-infecciones-de-transmision-sexual>

La edad de las personas con mayor reporte de esta condición de salud, es la comprendida entre 20 y 29 años, seguidamente por aquella que se encuentra en el rango de 30 a 39 años.



Fuente: Gráfico elaboración propia con datos proporcionado por OIR MINSAL.

Las principales afecciones registradas es la Sífilis, seguidamente por la Tricomoniasis y la infección anogenital por herpesvirus.

Tipo de infección	Datos ITS desagregados por sexo		
	2021		Total General 2021
	Masculino	Femenino	
Tricomoniasis	89	2,044	2,133
Sífilis	1,568	2,431	3,999
Infección anogenital por herpesvirus	351	442	793
Infección gonocócica	480	173	653
Infección por clamidia tracomatis	42	334	376
Chancroide	73	30	103
Sífilis congénita	21	19	40
Hepatitis aguda tipo c (pc)	15	8	23
Hepatitis aguda tipo b	40	10	50
Linfogranuloma venéreo	14	25	39
Granuloma inguinal	6	10	16
Total	2,699	5,526	8,225

Fuente: Tabla elaboración propia con datos proporcionados por OIR MINSAL.

Aunque las cifras indican que las consultas por infecciones de transmisión sexual tienden a la baja desde el año 2020, esto no debe interpretarse como la disminución de transmisión si no estos datos invitan a cuestionar si se están realizando menos pruebas de detección o si menos personas están acudiendo a los establecimientos de salud.